

Ìóðàââé-íóëÿ

Ìóðàââé-íóëÿ (Paraponera clavata) – íäeí ñàìúð èðóííúð eçâñòíúð íáóeá íóðàâúââ. Íáeòáàò á eãñíúð ìàññeáàò Êíñòà-Ðeéá, à ìàçáàíeá ñáíá ïïeó-èè ìò áíeááíáí áíçááeñòâeÿ, èíðíðúì íáeàââàò ááí óeóñ.

Ìáñòì óeóñà ÿòíáí ìóðàâúÿ íá ìáðáñòáàò áíeáòú à ðá-áíeá ñóòíe ïñeá óeóñà. Êðíá ìíúíúð -áeðñòáé, ÿòì ðeùíá íáñáeííá ìðe-éííe í-áíú ñeéúííá ææáíeÿ.

Á ìðeðíáá ìóðàâúe-íóeè ìíðÿòñÿ ìá ðàçeè-íúð ìáñáeííúð, ìðe ÿòì ìðeíáíÿÿ ááñú ñáíe ìðeðíáíúe àðñáíe – æàeíí ó. Á ìáðÿáíáíe éóeüòóðá ìííàeò èíñòà-ðeéáíñeè ìeáíáí á äðááíñòe áúeí íáñeíeüeí ìáðÿáíá ìíñáÿúáíeÿ á ìóæ-éíú ñ ìðeíáíáíe è ðóeá èñíúòóáííá. Á ðáçóeüòáà, ìóæ-éííe ñ-eòáeñÿ óíð, èòì ñííá ìðáââeáííá áðáíÿ áúááðæàòú óeóñú ìðeáâðeò ìóðàâúââ.

Ìóðàââé-íóëÿ (Paraponera clavata) - Áeááí