Êðàñíàÿ ÿäîâèòàÿ ëÿãóøêà (Dendrobatidae)

Êðàñíàÿ ÿäîâèòàÿ ëÿãóøêà (Dendrobatidae) – èõ åùå íàçûâàþò äðåâîëàçàìè, íàñåëÿþò îáû÷íî íèæíèå ÿðóñû äîæäåâûõ ò

ßðêàÿ îêðàñêà ýòîé ëÿãóøêè ñëóæèò ïðåäóïðåæäåíèåì äëÿ õèùíèêîâ î òîì, ÷òî êîæíûå æåëåçû ýòèõ âèäîâ âûðàáàòûâàþ Ðèêè.

Ðàçìåðû ýòî àìôèáèè íåáîëüøèå, âñåãî 2-3 ñì, êîíå÷íîñòè ëèøåíû îáû÷íûõ ïåðåïîíîê, íî èìåþò ñïåöèàëüíûå ïðèñïîñêè, êîòîðû

ßäîâèòûé ñåêðåò, êîòîðûé ñîäåðæèòñÿ íà êîæå ýòèõ ëÿãóøåê, âûðàáàòûâàåòñÿ âñëåäñòâèå ñïåöèôè÷åñêîãî ðàöèîíà, ñóùåñòâåíí ïàäàåò ïðè ñîäåðæàíèè ýòîé ëÿãóøêè â íåâîëå, ÷òî äåëàåò âîçìîæíûì ñîäåðæàòü åå â äîìàøíèõ óñëîâèÿõ.

Ñâîå àíãëèéñêîå íàçâàíèå «red poison dart frog» ýòà êðàñèâàÿ ëÿãóøêà ïîëó÷èëà â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî ìíîãèå èíäåéñêèå ïë ÿäîâèòûé ñåêðåò äëÿ èçãîòîâëåíèÿ îòðàâëåííûõ ñòðåë, êîòîðûé èñïîëüçîâàëèñü íà îõîòå è â ìåæäîóñîáíûõ âîéíàõ.

Êðàñíàÿ ÿäîâèòàÿ ëÿãóøêà (Dendrobatidae) - Âèäåî