

Éðàñíäý ýäíâèòàý ëýãóøèà (Dendrobatidae)

Éðàñíäý ýäíâèòàý ëýãóøèà (Dendrobatidae) – èõ áùá íàçúääðò äðääíèàçàìè, íàñáëýðò íáú÷íí íéæíèá ýðóñú äíæääáúó ò

Ððéäý íèðàñèà ýóíé ëýãóøèè ñéóæèò ìðääóíðáæääíèáí äëý òëúíèèíá ì òí, ÷òí êíæíúá æáéáçú ýòèò áèáíá áúðááàòúááð
Ðéèè.

Ðàçíáðú ýóí àìòéáèè íááíëüøéá, áñááí 2-3 ñí, êííá÷ííðè èèøáíú íáú÷ííó ìáðáíííè, íí èìáðò ñíáòèáëúíúá ìðèñíñèè, êíòíðúá
Ðáíáèòóúé ñáèðáò, êíòíðúé ñíááðæèðñý íá êíæá ýòèò ëýãóøáé, áúðááàòúáááòñý áñèääñðáèá ñíáòèòè÷-áñéíáí ðáöèííá,
ñóúáñòááííí ìááááò ìðè ñíááðæáíèè ýóíé ëýãóøèè á íááíèá, ÷òí ááèááò áíçííæíúí ñíááðæáòú áá á äíìáøíèò óñèíáëýð.

Ñáíá áíáèèèñíèá íàçááíèá «red poison dart frog» ýòá èðàñèáý ëýãóøèá ìíéó÷èèá á ñáýçè ñ òáì, ÷òí ìííáèá èíááéñèèá ì
ýäíâèòóúé ñáèðáò äëý èçáíòíáèáíëý ìððáèèáíúó ñòðáè, êíòíðúé èñííèüçíááèèñú íá ìòíòá è á ìæáíóñíáíúó áíéíáð.

Éðàñíäý ýäíâèòàý ëýãóøèà (Dendrobatidae) - Áèääí