

Àíáðèèáíñèéé èàìáìòεί (Trichechus manatus)

Àíáðèèáíñèéé èàìáìòεί (Trichechus manatus) – Ì-áíú êðóíííá ïðñêíá æεáíóííá, ïáðεíáε-áñèε áñòðá-àðùááñý à ïðεάðáæ ýêñεóðñéé, à òáε æá ýêñεóðñéé ïí íááíεùøεì ðá-êài è êáìáεái ïáøεííáεùííáí ïáðèà Óíðòóááðí.

Íòááεùíúá ïñíáε ïñáòò áñòεááòú á æεéíó 4,5 ïáððíá, à ááñεòú áí ïñεóòíðá ðííí. Ñáíεε ïáú-íí áíðáçáí áíεùøá ñáìòíá, à ááò
Àíáðèèáíñèéé èàìáìòεί ïáεòááò á ïáñòáð, ááá ó íááí ïòñóòñòáóðò áñòáñòááííúá áðááε, ïíγòíó γóí æεáíòííá ïðáεòε-áñé
εáε áíáí, òáε è ïí-ùð, ïáðεíáε-áñèε ïñáíεíáγñú ïá ïñááðóííñòú, -òíáú ááíóíóòú áíçáóóá. Êðííá γóíáí, ïíε ñíñíáíú εóáóðεáòúñý ïíá
Íñííáííε ïεùáé äëý íεð ñεóæεò ðáçεε-íáý áíáíáý ðáñòεòáεùííñòú, êíòíðáý ðáñòáò ïá ïáεεíáíáúá, ïíγòíó ááεáéí ïò ááðáá
Àíáðèèáíñèéé èàìáìòεί – ðááéíá æεáíòííá, çáíáñáíííá á ïáæáóíáðíáíóð Êðáñíóð êíεáó. Íáεòáý ïá áíáíεùíí ïáεéεó ó
Ðεέε ñíçááðòñý áñá óñêíáεý äëý òíáí, -òíáú γóíò ðááééé áεá ïíá ñííéíéíí æεòú è ðáçííáεáòúñý. Óñεéëýíε áíñóááðñòáà è -áñ

Àíáðèèáíñèéé èàìáìòεί (Trichechus manatus) - Àεááí